

子宮体癌、子宮頸癌、卵巣癌

2020/7/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
AP	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注 15分	d1	21日	子宮体癌
	シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注 2時間			
TC	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3時間	d1	21日	子宮体癌 子宮頸癌、卵巣癌
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
TC+BEV	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注 3時間	d1	21日	卵巣癌
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回90分) (2回目60分)	d1		
CPT-11	イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注 90分	d1,8,15	28日	卵巣癌、子宮頸癌
PLD+BEV	リポソーマル ドキソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注 90分	d1	28日	卵巣癌
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回90分) (2回目60分)	d1		
GEM+BEV	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8	21日	卵巣癌
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回90分) (2回目60分)	d1		
PLD+CBDCA	リポソーマル ドキソルビシン	30 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	28日	卵巣癌
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
PLD	リポソーマル ドキソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注 90分	d1	28日	卵巣癌
weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 90分	d1,8,15	28日	卵巣癌、子宮頸癌

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。