

大腸癌

2020/7/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
FOLFIRI	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
XELOX	カベシタピン	2000 mg/m <sup>2</sup> /日	1日2回 内服	d1夕-15朝*	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	*カベシタピンの投与日は、医師の指示があればそれに従う					
SOX	S-1	80 mg/m <sup>2</sup> /日	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
FOLFOXIRI	イリノテカン	165 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	3200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 48時間	d1		
BEV +mFOLFOX6	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
BEV +FOLFIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
BEV +XELOX	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌
	カベシタピン	2000 mg/m <sup>2</sup> /日	1日2回 内服	d1夕-15朝*		
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	*カベシタピンの投与日は、医師の指示があればそれに従う					
BEV +IRIS	S-1	80 mg/m <sup>2</sup> /日	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1		
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1		
パニツムマブ +mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
パニツムマブ +FOLFIRI	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
Ramucirumab +FOLFIRI	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
BEV +トリフルリジン・ チピラシル塩酸塩 配合錠	ロンサーフ配合錠	70 mg/m <sup>2</sup> /日	1日2回 内服	d 1-5,d8-12	28日	大腸癌
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。