

肺癌

2020/7/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
DTX	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	21日	非小細胞肺癌
CDDP(*CBDCA) +PEM** +Pembrolizumab	ベムプロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)
	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注 10分	d1		
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注 60分	d1		
	*カルボプラチン	AUC5	点滴静注 60分	d1		
*シスプラチンもしくはカルボプラチンのいずれかを投与 **PEMをMTAと表記する場合もある						
PEM* + Pembrolizumab	ベムプロリズマブ	200mg	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)
	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注 10分	d1		
	*PEMをMTAと表記する場合もある					
CBDCA+nab-PTX +Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
CBDCA +PTX(*nab-PTX) +Pembrolizumab	ベムプロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)
	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注 180分	d1		
	*アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
*パクリタキセルもしくはアブラキサン [®] のいずれかを投与						
Ramcirumab +DTX	ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴静注 60分	d1	21日	非小細胞肺癌
	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注 60分	d1		
Nivolumab	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注 30分	d1	14日	非小細胞肺癌
Pembrolizumab	ベムプロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌
Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	非小細胞肺癌
VNR	ビノレルビン	25 mg/m ²	点滴静注 6分	d1,8,15	28日	非小細胞肺癌
CBDCA+ETP +Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	小細胞肺癌
	エトボシド	100 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,2,3		
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
AMR	アムルピシン	40mg/m ²	点滴静注 10分	d1,2,3	21日	小細胞肺癌

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。