

入院診療計画書(TP療法を受ける患者さまへ)

ID番号 @PATIENTID
病名(他に考える病名)

氏名 @PATIENTNAME 様

@PATIENTWARD 病棟

@PATIENTROOM 号室








担当医師 @USERNAME

印

担当看護師

担当薬剤師

@SYSDATE

月日	/ /	/ /	/ /	/ /									
経過	化学療法前日 	化学療法当日	2日目	退院 3日目 									
目標	治療の準備ができる。	安心して化学療法が受けられる。	副作用について理解できる。	退院できる。									
検査 測定	化学療法前に外来で採血があります。	点滴開始時から尿量を測ります。		本日の朝6時で尿量測定は終了です。									
注射	輸液 4本 →	 <p>輸液</p> <table border="1"> <tr> <td>腎保護剤</td> <td>吐き気止め</td> <td>吐き気止め</td> <td>パクリタキセル</td> <td>シスプラチン</td> <td>輸液</td> <td>輸液</td> <td>利尿剤</td> <td>輸液</td> </tr> </table>		腎保護剤	吐き気止め	吐き気止め	パクリタキセル	シスプラチン	輸液	輸液	利尿剤	輸液	輸液2本 → 点滴は特にありません。
腎保護剤	吐き気止め	吐き気止め	パクリタキセル	シスプラチン	輸液	輸液	利尿剤	輸液					
観察	検温があります。	体温、脈、血圧測定をします。 (心電図モニターをつけることがあります。) 抗癌剤開始後、5~10分程度、7mg ⁺ -症状がないかを観察します。 点滴の針が入っているところが痛んだり、腫れてきたりしたらすぐに看護師を呼んでください。	検温があります。 気分が悪い時は声をかけてください。										
内服	内服中のお薬が有れば普段通り内服して下さい。	パクリタキセル投与の約30分前に抗7mg ⁺ -薬を5錠内服します。 											
食事		特に食事の制限はありません。 嘔気予防のため腹8分目に抑えておく和良好的です。 病院内の食事内容を変えることもできます。 ご希望の方は看護師に相談してください。 											
行動	活動・入浴に制限はありません。	点滴が入っているときは... 点滴の管を引っ張ったり、身体の下敷きにならないように注意しましょう。 気分が悪いときは一人で行動せず、看護師を呼んでください。											
説明	看護師から入院生活について説明があります。治療中、治療後の注意事項について説明します。医師や薬剤師から化学療法の方法や副作用について説明があります。	看護師から退院後の生活について説明があります。	退院時には <input type="checkbox"/> 退院証明書 <input type="checkbox"/> 次回予約票 <input type="checkbox"/> 退院処方(必要時)を受け取ったことを確認してください。	 ……など 婦人科外来 024-547-1226 みらい棟4階東病棟 024-547-1629									

<退院後の生活について>

・人ごみを避け、外出時はマスク着用しましょう。また、手洗いうがいをし感染予防を心がけましょう。

・抗癌剤治療の影響で免疫力が下がると口内炎ができたり、お口の中が荒れる場合があります。食事のあとは歯磨きをし、お口の中の清潔を保ちましょう。

以下のことがあれば、我慢せずにお電話ください。

- ・38度以上の熱が続く。
- ・嘔吐や吐き気が続き、食事・水分を摂るのが困難。
- ・便秘や下痢が何日も続く。
- ・痛みが強くなってきた。

……など

注1) 病名は現時点で考えられるものであり、今後の検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです。
注2) 入院期間については現時点で予想されるものです。

特別な栄養管理の必要性	有	無
-------------	---	---

上記内容について説明を受け同意いたしました。

署名： _____ 続柄： _____