

# 入院診療計画書（高位脛骨骨切り術を受けられる方へ）

ID番号 @PATIENTID  
病名（他に考える病名）

氏名 @PATIENTNAME

様

症状

@PATIENTWARD

病棟

@PATIENTROOM

号室

担当医師 @USERNAME

印

担当看護師

担当薬剤師

@SYSDATE

月日	手術決定から入院まで	手術前日	手術当日（前）	手術当日（後）	術後1日（ / ）	術後2～6日日（ / ）	術後7～13日（ / ）	術後14～24日（ / ）	術後25日（ / ）
経過		<b>入院</b> 							<b>退院</b> 
目標	体調を整えて手術を受けることができる				ベットの脇に座る（端坐位）ことや起立訓練ができる 	車椅子や歩行器歩行ができる 	 平行棒や歩行器で1/2部分荷重歩行訓練ができる	全荷重で、T字杖での歩行訓練ができる 	T字杖歩行が安定し、階段昇降ができれば退院になります。
検査	外来で全身麻酔の検査をします	必要な検査があれば行います		手術後に血液検査 	血液検査 	血液検査 	血液検査 	血液検査 	
治療			<b>手術</b> 	酸素吸入 疼痛コントロール などを行います	リハビリ開始です 	器具を用いて膝屈曲訓練が始まります			
処置		リストバンドをつけ、腕に名前と血液型を書きます		術後尿の管や創に管が入ってきます	痛みは我慢せずにお知らせください	消毒は2～3日おきに行います。創の管を抜きます。尿の管も抜きます。	消毒は2～3日おきに行います	抜糸 術後14日で抜糸です	
観察		 体温・脈拍・血圧測定	 体温・脈拍・血圧測定	 体温・脈拍・血圧測定	 体温・脈拍・血圧測定	 体温・脈拍・血圧測定	 体温・脈拍・血圧測定	 体温・脈拍・血圧測定	
注射				点滴 補液 抗生剤 自己血 	点滴 補液 抗生剤 自己血 血液をサラサラにする注射をします（7-14日間） 	点滴 補液 抗生剤 食事が可能になれば点滴を中止します。水分を多めにとり、脱水予防に努めましょう 			
内服	いつも飲んでいる薬をお見せください。薬剤師よりご説明いたします	普段から飲んでいる薬は飲んでください 	医師から指示のあった薬は少量の水で飲んでください 		くすりの内服を始めます 				
食事	 通常通り	夜9時以降は <b>絶食</b> です。水分は指示された時間までとって	<b>絶飲食</b> です（うがいや歯磨きは可能です）		 通常通り	 通常通り	 通常通り	 通常通り	
行動	通常通りです。				 体を拭きます	車椅子でトイレに行くことができます	転ばないように注意しましょう	 シャワーが可能です	
説明		手術の説明があります 	ご家族の方は病室でおまちください	 術後の説明があります					退院前に説明があります

注1) 病名は現時点で考えられるものであり、今後の検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです。

福島県立医科大学附属病院 パス承認番号 (No. 234 ) 承認月日 (平成 28年 2月 29日)

注2) 入院期間については現時点で予想されるものです。

特別な栄養管理の必要性

有 ・ 無

上記内容について説明を受け同意いたしました。

署名: \_\_\_\_\_ 続柄: \_\_\_\_\_